Bethanechol 用藥指導單張

★ 英文發音：be-THAN-e-kole

★ 規格： 25 mg/tablet

★ 醫師為什麼開此藥？

Bethanechol 可用來減緩因手術、藥物或其他原因引起之排尿困難。此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

★ 此藥該如何使用？

Bethanechol 是口服錠劑，通常一天服用二至四次，服藥間隔要平均。請遵照醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。

Bethanechol 應空腹服用(飯前至少 1 小時或飯後 2 小時)以避免胃部不適。

★ 使用時我該特別注意的事項？

在服用此藥前，

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對 Bethanechol 或其他用藥有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(包含非處方藥)，特別是 Procainamide（Pronestyl)，Quinidine（Quinaglute)，感冒藥，鼻充血藥及維他命。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病如：氣喘，膀胱感染，癲癇，高血壓，心臟病，帕金森病、甲狀腺亢奮或潰瘍。
4. 你必須知道這個藥可能會導致暈眩，在您清楚藥物可能對您的影響前不要開車或使用危險機械。
5. 酒精會加重此藥導致的嗜睡作用，服用此藥期間請勿飲酒。

★ 孕婦用藥等級及注意事項

孕婦用藥等級：C。若妳已懷孕，就診時請務必告知醫師並告知週數。

★ 計劃懷孕注意事項

如妳計畫準備懷孕，或在服藥期間已懷孕，就診時請務必告知醫師。

★ 嬰兒哺乳等級及注意事項

若妳給嬰兒餵母乳，就診時請務必告知醫師。

★ 當我忘記服用一個劑量時，我該怎麼辦？

盡可能在您想起時，立刻補服一個劑量；但若幾乎到吃下一個劑量的時間，那就略過前次劑量，而在下次用藥時間服藥。不要為了補吃錯過的劑量而服用雙倍劑量。

★ 此藥會造成什麼副作用？我該怎麼做？

雖然 Bethanechol 導致的副作用並不常見，但還是可能發生。若是有以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請通知您的醫師：胃不舒服、眩暈、嘔吐、冒汗或潮紅。若您有下列任一症狀，請立刻通知醫師：呼吸短促、昏倒、心跳變慢(每分鐘<50 下)。

★ 此藥儲存的條件為何？

將藥物存放於容器中鎖緊，並置於小孩子拿不到的地方。將藥物儲存在室溫，遠離高溫、高溼度處（勿置於浴室）和直接的陽光照射。將過期或不再需要的藥物丟棄，請教藥師如何適當處理此藥。

★ 我還該知道什麼其他資訊？

要定期回診。不要讓任何人服用你的藥物。可詢問藥師任何有關藥物再調配的問題。

衛生福利部臺北醫院
Taipei Hospital, Ministry of Health and Welfare